

**INFORMACIÓN PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS
VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA TÉTANOS Y TOS FERINA EN LA MUJER
EMBARAZADA****¿Qué es la tos ferina?**

La tos ferina, es una infección respiratoria bacteriana. Se propaga fácilmente a través del aire en pequeñas gotitas que contienen la bacteria y que se producen sobre todo cuando la persona infectada estornuda o tose.

Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de un resfriado común, más tarde puede comenzar con tos convulsiva, brusca, involuntaria, causando accesos de tos severa que pueden producir dificultades para respirar, vómitos y alteraciones del sueño. Esta infección se puede producir a cualquier edad, puede causar complicaciones graves en los lactantes menores de 6 meses.

¿Por qué tengo que vacunarme frente a tos ferina?

Se recomienda la vacunación de la mujer embarazada frente a tos ferina para proteger al bebé, hasta que pueda recibir la primera dosis de la vacuna a los 2 meses de vida.

¿Cuándo me tengo que vacunar?

El momento óptimo para la vacunación es entre la semana 28 y la 32 de gestación, aunque se puede vacunar hasta la semana 36.

¿Qué vacuna se administra?

La vacuna que se administra es la vacuna combinada frente a difteria, tétanos y tos ferina de componente antigénico reducido (dTpa).

Al recibir la vacuna en el tercer trimestre de embarazo producirá anticuerpos que son los que al pasar a través de la placenta protegerán al bebé, y también le protegerá a usted frente a la enfermedad.

¿Es segura la vacuna?

Si la vacuna es segura, la mayoría de los efectos secundarios que produce son leves y transitorios, como enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de la vacunación. Muy rara vez puede producir efectos secundarios graves.

Si observa tras la vacunación la aparición de algún síntoma importante debe comunicarlo a su médico.

¿Si me vacuno durante el embarazo, tengo que vacunar también a mi bebé frente a tos ferina?

Si, es muy importante que no olvide vacunar a su bebé en el momento que cumpla los 2 meses de vida para asegurar la protección temprana. Si usted recibe la vacuna durante el embarazo, los anticuerpos que le transmite a través de la placenta duran poco tiempo.

